

ENDOSCOPIA DE TEXAS

6405 W. Parker Rd, Suite 370 • Plano, Texas 75093 • 972-473-9900
8080 Independence Parkway, Suite 160 • Plano, TX 75025 • 972-908-3000

***DEBE TENER TRANSPORTE desde las instalaciones por parte de un familiar o amigo adulto. No taxis, No Uber, No Lyft ningún otro transporte público, ni siquiera servicios de transporte médico pagados o no pagados. Si no cuenta con este transporte cuando llegue, se le cancelará su(s) procedimiento(s).**

**Si tiene alguna pregunta sobre las instrucciones de preparación intestinal, llame al consultorio de su médico:
La oficina de McKinney es 972-562-4430 La oficina de Plano es 972-.943-9094*

Instrucciones de preparación para la Sigmoidoscopia Flexible

7 días antes del procedimiento:

INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS:

- SI está tomando estos medicamentos semanalmente para bajar de peso, debe suspenderlos durante 7 días antes de la fecha de su procedimiento:** Cualquier semiglúrida: Ozempic®, Wegovy®, Trulicity®, Bydureon®, Mounjaro®, Zepbound®. Si no ha suspendido estos medicamentos, se cancelará su procedimiento.
- SI está tomando estos medicamentos diariamente para la diabetes, debe suspenderlos el día anterior a su procedimiento:** Rybelsus®, Victoza®, Saxenda®, Byetta®, Invokana®, Steglatro®, Farxiga®, Adlyxin®. Si no ha suspendido estos medicamentos, su procedimiento será cancelado.
- SI está tomando Plavix®, Coumadin® (Warfarin®), Lovenox®, Eliquis®, Brilinta® o cualquier otro anticoagulante recetado,** es muy importante que notifique a la enfermera del consultorio de su médico gastrointestinal para obtener instrucciones sobre cuándo **DEJE** de tomar este medicamento antes de su procedimiento (ver los números arriba).
- SI está tomando un medicamento dietético que contiene el producto PHENTERMINE® DEBE SUSPENDER ESTE MEDICAMENTO 4 DÍAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO**
- SI está tomando 325 mg de Aspirina®, Combian Ca dosis a 81 mg de Aspirina® Por 7 días antes de su procedimiento.** Si está tomando 81 mg de Aspirin®, no lo suspenda antes del procedimiento a menos que su médico gastrointestinal o el médico que le recete este medicamento se lo indique específicamente.
- NO coma NUECES ni SEMILLAS,** es decir, palomitas de maíz, fresas, etc. durante los 7 días anteriores al Procedimiento.

Instrucciones de preparación para la Sigmoidoscopia Flexible

UN DÍA ANTES:

- I. A las 6:00 p.m. estará siguiendo una dieta SÓLO de líquidos claros.
 - Lista de líquidos: Té, café negro (sin crema), Coca-Cola®, Sprite®, refrescos dietéticos, pollo o carne. Caldo, Jell-O®, popsicles®, jugo de manzana, jugo de arándano (rojo natural), Gatorade®, Powerade®, y agua. Absolutamente no se permiten productos RED Jell-O® o RED/MORADOS. Sin jugo de naranja, leche o Productos lácteos.

DÍA DEL PROCEDIMIENTO:

1. 5 horas antes del momento del procedimiento
 - A. Mezcle 128 g de Miralax con 32 oz de agua. Beba esto durante la próxima UNA hora.
 - B. NADA por vía oral 4 horas antes de su procedimiento.
2. Nada por vía oral 4 horas antes de su procedimiento, excepto: Puede tomar Tiroides, Medicina Para Las Medicamentos para la presión arterial, el corazón, las convulsiones o la ansiedad con pequeños sorbos de agua a más tardar 2 horas antes de su procedimiento.

****NO tome sus medicamentos para la diabetes esta mañana antes del procedimiento****